

PŘÍBALOVÁ INFORMACE K PŘÍPRAVKU DIETAN

Název přípravku: DIETAN

Výrobce a držitel rozhodnutí o povolení: UNIVIT s.r.o., Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc

Složení 1 kg přípravku:

Quercus robur (petraea)	550 g
Matricaria chamomilla	200 g
Sodium salicylate	20 g
Saccharosum	230 g

Charakteristika:

Bylinný přípravek, který se používá jako součást protiprůjmových opatření vzniklých při chybách ve výživě zvířat. Působí antisepticky, ochraňuje střevní sliznici a zabraňuje vstřebávání škodlivých látek. Hlavními účinnými složkami jsou heřmánek a dubová kůra. Aktivními látkami heřmánku jsou silice, které působí jako antiflogistikum a spasmolytikum, účinné jsou i proti nadýmání. Dubová kůra obsahuje množství tříslovin, které působí svíravě a mají protizánětlivé účinky.

Použití Používá se jako součást protiprůjmových opatření při dietetických chybách.

Dávkování

Pes a kočka: 50 mg přípravku /kg ž. hm. Podávat do vymizení příznaků.

Telata, skot: 0,2 g/kg ž. hm./den. Podávat 3-4 dny. Přípravek se rozmíchá v teplé vodě a podává se 2x denně (ráno a večer) samostatně nebo zamíchaný v krmivu.

Odstavená selata: 0,2-0,3 g/kg ž.hm./den. Podávat po dobu 21 dní. Aplikovat 5 dní před odstavením.

Výkrm prasat: 0,2-0,3 g/kg ž.hm./den. Podávat po dobu 10 dní.

Drůbež: 1 čajová lžička přípravku na 10 ks nebo 50-70 g/100 l pitné vody. Podávat po dobu 5-7 dní.

Králíci: 0,35-0,75 g/ks/den. Podávat první 2-3 týdny po odstavu.

Uchovávání Uchovávat v suchu při teplotě do 25°C.

Balení 120 g, 1 kg, 5 kg

Použití, expirace 24 měsíců od data výroby.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE K PŘÍPRAVKU DIETAN

Název přípravku: DIETAN

Výrobce a držitel rozhodnutí o povolení: UNIVIT s.r.o., Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc

Složení 1 kg přípravku:

Quercus robur (petraea)	550 g
Matricaria chamomilla	200 g
Sodium salicylate	20 g
Saccharosum	230 g

Charakteristika:

Bylinný přípravek, který se používá jako součást protiprůjmových opatření vzniklých při chybách ve výživě zvířat. Působí antisepticky, ochraňuje střevní sliznici a zabraňuje vstřebávání škodlivých látek. Hlavními účinnými složkami jsou heřmánek a dubová kůra. Aktivními látkami heřmánku jsou silice, které působí jako antiflogistikum a spasmolytikum, účinné jsou i proti nadýmání. Dubová kůra obsahuje množství tříslovin, které působí svíravě a mají protizánětlivé účinky.

Použití Používá se jako součást protiprůjmových opatření při dietetických chybách.

Dávkování

Pes a kočka: 50 mg přípravku /kg ž. hm. Podávat do vymizení příznaků.

Telata, skot: 0,2 g/kg ž. hm./den. Podávat 3-4 dny. Přípravek se rozmíchá v teplé vodě a podává se 2x denně (ráno a večer) samostatně nebo zamíchaný v krmivu.

Odstavená selata: 0,2-0,3 g/kg ž.hm./den. Podávat po dobu 21 dní. Aplikovat 5 dní před odstavením.

Výkrm prasat: 0,2-0,3 g/kg ž.hm./den. Podávat po dobu 10 dní.

Drůbež: 1 čajová lžička přípravku na 10 ks nebo 50-70 g/100 l pitné vody. Podávat po dobu 5-7 dní.

Králíci: 0,35-0,75 g/ks/den. Podávat první 2-3 týdny po odstavu.

Uchovávání Uchovávat v suchu při teplotě do 25°C.

Balení 120 g, 1 kg, 5 kg

Použití, expirace 24 měsíců od data výroby.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE K PŘÍPRAVKU DIETAN

Název přípravku: DIETAN

Výrobce a držitel rozhodnutí o povolení: UNIVIT s.r.o., Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc

Složení 1 kg přípravku:

Quercus robur (petraea)	550 g
Matricaria chamomilla	200 g
Sodium salicylate	20 g
Saccharosum	230 g

Charakteristika:

Bylinný přípravek, který se používá jako součást protiprůjmových opatření vzniklých při chybách ve výživě zvířat. Působí antisepticky, ochraňuje střevní sliznici a zabraňuje vstřebávání škodlivých látek. Hlavními účinnými složkami jsou heřmánek a dubová kůra. Aktivními látkami heřmánku jsou silice, které působí jako antiflogistikum a spasmolytikum, účinné jsou i proti nadýmání. Dubová kůra obsahuje množství tříslovin, které působí svíravě a mají protizánětlivé účinky.

Použití Používá se jako součást protiprůjmových opatření při dietetických chybách.

Dávkování

Pes a kočka: 50 mg přípravku /kg ž. hm. Podávat do vymizení příznaků.

Telata, skot: 0,2 g/kg ž. hm./den. Podávat 3-4 dny. Přípravek se rozmíchá v teplé vodě a podává se 2x denně (ráno a večer) samostatně nebo zamíchaný v krmivu.

Odstavená selata: 0,2-0,3 g/kg ž.hm./den. Podávat po dobu 21 dní. Aplikovat 5 dní před odstavením.

Výkrm prasat: 0,2-0,3 g/kg ž.hm./den. Podávat po dobu 10 dní.

Drůbež: 1 čajová lžička přípravku na 10 ks nebo 50-70 g/100 l pitné vody. Podávat po dobu 5-7 dní.

Králíci: 0,35-0,75 g/ks/den. Podávat první 2-3 týdny po odstavu.

Uchovávání Uchovávat v suchu při teplotě do 25°C.

Balení 120 g, 1 kg, 5 kg

Použití, expirace 24 měsíců od data výroby.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE K PŘÍPRAVKU DIETAN

Název přípravku: DIETAN

Výrobce a držitel rozhodnutí o povolení: UNIVIT s.r.o., Na Vlčinci 16/3, 779 00 Olomouc

Složení 1 kg přípravku:

Quercus robur (petraea)	550 g
Matricaria chamomilla	200 g
Sodium salicylate	20 g
Saccharosum	230 g

Charakteristika:

Bylinný přípravek, který se používá jako součást protiprůjmových opatření vzniklých při chybách ve výživě zvířat. Působí antisepticky, ochraňuje střevní sliznici a zabraňuje vstřebávání škodlivých látek. Hlavními účinnými složkami jsou heřmánek a dubová kůra. Aktivními látkami heřmánku jsou silice, které působí jako antiflogistikum a spasmolytikum, účinné jsou i proti nadýmání. Dubová kůra obsahuje množství tříslovin, které působí svíravě a mají protizánětlivé účinky.

Použití Používá se jako součást protiprůjmových opatření při dietetických chybách.

Dávkování

Pes a kočka: 50 mg přípravku /kg ž. hm. Podávat do vymizení příznaků.

Telata, skot: 0,2 g/kg ž. hm./den. Podávat 3-4 dny. Přípravek se rozmíchá v teplé vodě a podává se 2x denně (ráno a večer) samostatně nebo zamíchaný v krmivu.

Odstavená selata: 0,2-0,3 g/kg ž.hm./den. Podávat po dobu 21 dní. Aplikovat 5 dní před odstavením.

Výkrm prasat: 0,2-0,3 g/kg ž.hm./den. Podávat po dobu 10 dní.

Drůbež: 1 čajová lžička přípravku na 10 ks nebo 50-70 g/100 l pitné vody. Podávat po dobu 5-7 dní.

Králíci: 0,35-0,75 g/ks/den. Podávat první 2-3 týdny po odstavu.

Uchovávání Uchovávat v suchu při teplotě do 25°C.

Balení 120 g, 1 kg, 5 kg

Použití, expirace 24 měsíců od data výroby.